

# Guia prático de identificação de Cordas de Viola

➔ *Ipomoea nil*

➔ *Merremia aegyptia*

➔ *Ipomoea triloba*

➔ *Ipomoea quamoclit*

➔ *Ipomoea hederifolia*

➔ *Ipomoea purpurea*

➔ *Merremia cissoides*

➔ *Ricinus communis*

➔ *Mucuna aterrima*

# *Ipomoea nil*

***Ipomoea nil*** ; planta anual, trepadeira, herbácea, de caules com densa pilosidade amarelada, de 1 – 3 m de comprimento, nativa da América do Sul, com muita expressão no Brasil. Propaga-se por meio de sementes.

Fonte: Lorenzi H.; Plantas daninhas do Brasil, 2000.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu

# *Merremia aegyptia*

***Merremia aegyptia***; planta anual, trepadeira, herbácea, com caules revestidos de pubescência hirsuta e amarelada, de 2 a 4 m de comprimento, nativa da América tropical e disseminada em todo o Brasil. Propaga-se por meio de sementes.

Fonte: Lorenzi H.; Plantas daninhas do Brasil, 2000.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu





# *Ipomoea triloba*

## *Ipomoea triloba (grandifolia);*

Planta anual, trepadeira, herbácea, de caules com leve pilosidade translúcida, de 1-2 m de comprimento. Folhas alternas; lâmina simples usualmente lobadas.

Fotos: Jedir Fiorelli



# *Ipomoea quamoclit*

***Ipomoea quamoclit*** ; planta anual, trepadeira, herbácea, glabra, de caules muito ramificados, com 90 a 180 cm de comprimento, nativa da América tropical e disseminada em todo o Brasil. Propaga-se por meio de sementes.

Fonte: Lorenzi H.; Plantas daninhas do Brasil, 2000.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu





# *Ipomoea hederifolia*

***Ipomoea hederifolia*** ; planta anual, trepadeira, glabra, robusta, com polimorfismo foliar, de ramos verdes ou marrons com 2 a 3 m de comprimento, nativa da América tropical e subtropical, ocorrendo em todo o Brasil. Propaga-se por meio de sementes.

Fonte: Lorenzi H.; Plantas daninhas do Brasil, 2000.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu

# *Ipomoea purpurea*

***Ipomoea purpurea*** ; Planta anual, trepadeira, ramificada, medindo até 2 m de compr. Folhas alternas, com ambas as faces. Com pecíolos pubescentes. As flores são em forma de funil com sépalas lanceoladas e pilosas, nas cores arroxeadada, branca, rósea, azul ou vermelha.





# *Merremia cissoides*

***Merremia cissoides***, planta anual, trepadeira, herbácea, de caule cilíndrico e hirsuto-piloso ou glabro, com 2 a 4 m de comprimento, nativa da América tropical e disseminada em todo o Brasil. Propaga-se por meio de sementes.

Fonte: Lorenzi H.; Plantas daninhas do Brasil, 2000.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu





# *Ricinus communis*

***Ricinus communis***, planta perene, arbustiva, muito ramificada, com 2 – 3 metros de altura. Propaga-se exclusivamente por semente, tem se tornado extremamente daninha à cultura da cana de açúcar com danos no canavial e operações de colheita.

Fotos: Jedir Fiorelli



Menu



# *Mucuna aterrima*

***Mucuna aterrima***, é uma leguminosa anual com hábito de crescimento trepadora. Tolerante à seca, sombreamento, tem se tornado daninha nos canaviais, possui sementes com dormência e capacidade de emergir mesmo em camadas mais profundas do solo, pode produzir 340 sementes / m<sup>2</sup> . Causam danos drásticos ao desenvolvimento do canavial e operacionais na colheita.

Fonte: Evangelista & Rocha, 1998; L.H. Campos 2011



Menu